

МНН, ЛФ, Дозировка	Критерии назначения, показания к применению	Необходимые лабораторные исследования, (МРТ, КТ, показатели крови и т.д.)	Рекомендованные суточная доза на 1 взрослого пациента с учетом веса, возраста и т.д.)			Показания для увеличения дозы	Показания для смены терапии (переключение, отмена)
Экулизумаб							
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл	Атипичный гемолитико-уремический синдром	Общий анализ крови, шизоциты, биохимический анализ крови с ЛДГ и креатинином	агус	Экулизумаб 1 введение (1 раз в 2 недели) (мл)	Экулизумаб 1 год (26 введений в год) (мл)	Увеличение веса пациента у детей	Согласно клиническим рекомендациям от 2022 г терапию экулизумабом рекомендовано продолжать пожизненно или рассмотреть возможность в ряде случаев отменить через 2 года от начала лечения только при отсутствии активности заболевания, стойкой нормотензии и низком риске рецидива на индивидуальной основе. Для решения вопроса отмены терапии необходимо принимать во внимание: тяжесть заболевания, продолжительность периода нормализации/стабилизации функции органов, семейный анамнез, результаты генетического анализа, наличие комлемент-активирующих состояний, комплаентность пациента, возможность быстрого рестарта терапии экулизумабом.
			≥ 100 кг	120	3120		
			60 - < 100 кг	120	3120		
			40 - < 60 кг	120	3120		
			30 - < 40 кг	90	2340		
			20 - < 30 кг	60	1560		
			10 - < 20 кг	30	780		
			5 - < 10 кг	30	510		